



ЗАМЕТКА

О находках каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) в Донецкой области [On the Records of Chestnut Leafminer *Cameraria ohridella* (Lepidoptera, Gracillariidae) in Donetsk Region]. — Массовое «порыжение» листья горькокаштана конского на юго-востоке Украины до последнего времени вызывалось неинфекционным увяданием и охряной пятнистостью, влияние вредителей оставалось несущественным (Попов, Бондаренко-Борисова. Промислова ботаніка. — 2007. — Вып. 7. — С. 251–257). Каштановая минирующая моль (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986), еще недавно неизвестная в Украине, за несколько последних лет распространилась по территории страны от Закарпатья на западе почти до Луганской обл. на востоке и от Сумской обл. на севере до Крыма на юге (Зерова и др. Каштановая минирующая моль в Украине. — К., 2007. — 88 с.; др.). Вид проник в Донецкую обл., по-видимому, не позднее 2006 г. (Бабидорич и др. Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье. — Алушта. — 2006. — С. 469–470; Нікітенко, Свиридов. Карантин і захист рослин. — 2007. — № 10. — С. 22–28) и в Донецк — не позднее 2007 г. (по нашим данным). В 2008 г. мины моли обнаружены нами почти во всех районах Донецка (Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Ленинский), в Ясиноватой и Макеевке, в долине р. Северский Донец (п. Дроновка). Мы оцениваем степень заселенности каштанов молью (Gilbert & Gtegoige, 2003) в парках, скверах и аллеях городов центра Донецкой обл. в подавляющем большинстве случаев в 3 балла (мины на 2/3 деревьев выборки), а степень заселения сложного листа — в 1 балл (2%), что говорит об успешной начальной стадии экспансии каштановой моли на восток Украины. — Г. В. Попов (Донецкий ботанический сад НАН Украины).